УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Просим Вас дать согласие на проведение **проф. прививки против инфекции COVID-19** во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2021 №1615 Вашему ребёнку.

Производство: Китайская Народная Республика «Vero Cell», внутримышечно (в плечо).

Противопоказано: лицам с повышением температуры тела, с выраженными симптомами COVID-19, после перенесенной инфекции COVID-19 в течение 6 месяцев, в анамнезе наличие анафилактической реакции на введение иммунобиологических препаратов.

Ф.И. ребёнка_____школа_____ класс_____

Согласна (согласен) Дата_____ подпись_____

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологи
Защититься от COVID-19 поможет
ПРИВИВКА
Вакцинация – эффективный спосо
надежная защита от вируса. Запи
можно в поликлинике по месту жител
В силах каждого из нас останови
Сделайте прививку от COVID-1
ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО ВАМ И


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЗ «МОГИЛЕВСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛО
Вакцинация от COVID
Наиболее быстрый и эффективный способ взять вирус
это вакцинация!
Чем больше людей имеет иммунитет к вирусу, тем быстрее он перест
в человеческой популяции!
Что нужно знать о вакцине?
✓ Вакцинация вызывает устойчивый сильный защитный эффект во
растных группах
✓ Эффективность вакцины составляет 91,6%
✓ Вакцина безопасна! Никаких серьезных нежелательных явлений, с
с вакцинацией, не зарегистрировано
✓ Заболеть коронавирусом при вакцинации невозможно (вакцина не
коронавирус, вызывающий COVID-19)
Кому следует прививаться?
✓ Здоровым лицам в возрасте от 18 лет, и особенно лицам, по роду
ятельности контактирующим с большим количеством людей и под
цирования (медицинским работникам, учителям, работникам соцза

УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемнологии и общественно

В СИЛАХ КАЖДОГО ИЗ НАС – ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ!



ВАКЦИНАЦ
из наиболее б
эффективных
«взять» вир
контро

ЗАПИСАТ
на приви
можно в поли
по месту жит
или рабо

Как проходит вакцинация?

Чтобы сделать прививку Гам-КОВИД-Вак, необходимо явиться в поликлинику дважды.

I этап (введение I компонента вакцины):

- Врач проведет общий осмотр, измерит температуру, предложит заполнить анкету о состоянии здоровья, возьмет согласие на прививку, информирует о возможных побочных реакциях и даст рекомендации о действиях после вакцинации.
- Вакцинация (вакцина вводится строго внутримышечно в верхнюю треть плеча – в дельтовидную мышцу, или бедро).
- Наблюдение после процедуры в течение 30 мин.

II этап (введение II компонента вакцины):

- Проводится на 21 день (без учёта дня вакцинации). Процедура проходит аналогично первому этапу вакцинации.

Что нужно делать после вакцинации?

Как и после любой прививки, в течение нескольких дней после нее рекомендуется воздержаться от посещения сауны, бани, избегать чрезмерных физических нагрузок, не давить и не тереть место инъекции. При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.

Какие побочные реакции могут возникнуть?

В большинстве случаев прививка переносится хорошо. Нежелательные реакции могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней.

Чаще других могут возникнуть кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций. О серьезных (лихорадка выше 40, отек в месте инъекции более 8 см) и необычных реакциях необходимо сообщать врачу.

ВАЖНО!!! ***Вакцины – это лекарственные средства, не быть побочных эффектов у них не может. Риск иметь тяжелую форму заболевания выше, чем риски возникновения побочных эффектов при вакцинации.***

Можно ли вакцинироваться Спутником V лицам старше 60 лет, беременным и кормящим женщинам?

На сегодняшний день инструкция к вакцине ограничивает возраст вакцинируемых с 18 лет. Беременность и кормление грудью внесены в противопоказания к вакцинации, т.к. эффективность и безопасность для данных групп не изучалась.

Можно ли прививаться переболевшим COVID-19 ранее или болеющим бессимптомно?

Инструкция к вакцине не запрещает вакцинацию лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию ранее. Но переболевшие COVID-19 могут отложить вакцинацию на 3-6 мес. Перед прививкой также необязательно сдавать тест на коронавирус, так как вакцинация во время бессимптомного течения коронавирусной инфекции не принесет вреда здоровью.

Нужно ли носить маску после вакцинации и соблюдать иные меры профилактики инфекции?

Иммунитет после прививки начинает формироваться не сразу, наиболее полная защита формируется через 1-2 недели после введения второго компонента. Поэтому, сразу после вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики – носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Будьте здоровы!

Тираж 200 экземпляров