

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Просим Вас дать согласие на проведение **проф. прививки против инфекции COVID-19** во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2021 №1615 Вашему ребёнку.

Производство: Китайская Народная Республика «Vero Cell», внутримышечно (в плечо).

Противопоказано: лицам с повышением температуры тела, с выраженными симптомами COVID-19, после перенесенной инфекции COVID-19 в течение 6 месяцев, в анамнезе наличие анафилактической реакции на введение иммунобиологических препаратов.

Ф.И. ребёнка _____ школа _____ класс _____
Согласна (согласен) Дата _____ подпись _____




ОСТАНОВИТЬ COVID -19

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ?



в медицинских
учреждениях
республики

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ НЕОБХОДИМО



заполнить
анкету
и согласие



пройти осмотр
врача

ПЕРИОД ВАКЦИНАЦИИ

После введения вакцины:

соблюдать рекомендации врача

следить за самочувствием



**Второй компонент
вводится через 21 день.**

**После формируется устойчивый
иммунитет, который может
сохраняться до 2-х лет.**

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ЭТО НОРМА



болезненность,
покраснение
на месте укола

кратковременное
повышение температуры

ВАЖНО! Д



носить маску



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

Защититься от COVID-19 поможет ПРИВИВКА

Вакцинация – эффективный способ надежная защита от вируса. Записаться можно в поликлинике по месту жительства.

В силах каждого из нас остановить

Сделайте прививку от COVID-19

ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО ВАМ ИМ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЗ «МОГИЛЕВСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛО

Вакцинация от COVID

Наиболее быстрый и эффективный способ взять вирус под контроль – это вакцинация!

Чем больше людей имеет иммунитет к вирусу, тем быстрее он перестанет распространяться в человеческой популяции!

Что нужно знать о вакцине?


- ✓ Вакцинация вызывает устойчивый сильный защитный эффект во всех возрастных группах
- ✓ Эффективность вакцины составляет **91,6%**
- ✓ Вакцина безопасна! Никаких серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано
- ✓ Заболеть коронавирусом при вакцинации невозможно (вакцина не содержит коронавируса, вызывающий COVID-19)

Кому следует прививаться?

- ✓ Здоровым лицам в возрасте от 18 лет, и особенно лицам, по роду деятельности контактирующим с большим количеством людей и подпадающим под риск заражения (медицинским работникам, учителям, работникам соцзащиты)

УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

В СИЛАХ КАЖДОГО ИЗ НАС – ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ!



ВАКЦИНАЦИЯ
из наиболее безопасных и
эффективных
«взять» вирус под
контроль.

ЗАПИСАТЬСЯ
на прививку
можно в поликлинику
по месту жительства
или работодателя.

Как проходит вакцинация?

Чтобы сделать прививку Гам-КОВИД-Вак, необходимо явиться в поликлинику дважды.

I этап (введение I компонента вакцины):

- Врач проведет общий осмотр, измерит температуру, предложит заполнить анкету о состоянии здоровья, возьмет согласие на прививку, информирует о возможных побочных реакциях и даст рекомендации о действиях после вакцинации.
- Вакцинация (вакцина вводится строго внутримышечно в верхнюю треть плеча – в дельтовидную мышцу, или бедро).
- Наблюдение после процедуры в течение 30 мин.

II этап (введение II компонента вакцины):

- Проводится на 21 день (без учёта дня вакцинации). Процедура проходит аналогично первому этапу вакцинации.

Что нужно делать после вакцинации?

Как и после любой прививки, в течение нескольких дней после нее рекомендуется воздержаться от посещения сауны, бани, избегать чрезмерных физических нагрузок, не давить и не тереть место инъекции. При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства.

Какие побочные реакции могут возникнуть?

В большинстве случаев прививка переносится хорошо. Нежелательные реакции могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней.

Чаше других могут возникнуть кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионар-

ных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций. О серьезных (лихорадка выше 40, отек в месте инъекции более 8 см) и необычных реакциях необходимо сообщать врачу.

ВАЖНО!!! Вакцины – это лекарственные средства, не быть побочных эффектов у них не может. Риск иметь тяжелую форму заболевания выше, чем риски возникновения побочных эффектов при вакцинации.

Можно ли вакцинироваться Спутником V лицам старше 60 лет, беременным и кормящим женщинам?

На сегодняшний день инструкция к вакцине ограничивает возраст вакцинируемых с 18 лет. Беременность и кормление грудью внесены в противопоказания к вакцинации, т.к. эффективность и безопасность для данных групп не изучалась.

Можно ли прививаться переболевшим COVID-19 ранее или болеющим бессимптомно?

Инструкция к вакцине не запрещает вакцинацию лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию ранее. Но переболевшие COVID-19 могут отложить вакцинацию на 3-6 мес. Перед прививкой также необязательно сдавать тест на коронавирус, так как вакцинация во время бессимптомного течения коронавирусной инфекции не принесет вреда здоровью.

Нужно ли носить маску после вакцинации и соблюдать иные меры профилактики инфекции?

Иммунитет после прививки начинает формироваться не сразу, наиболее полная защита формируется через 1-2 недели после введения второго компонента. Поэтому, сразу после вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики – носить маску, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Будьте здоровы!

Тираж 200 экземпляров